

# Algoritmo de tratamiento antitrombótico combinado ACO+AGP en pacientes con fibrilación auricular y enfermedad coronaria


(julio, 2015)

INDICACIÓN ACO

RIESGO HEMORRÁGICO

INDICACIÓN AGP

0 semanas  
4 semanas  
6 meses  
Hasta 12 meses  
Indefinido



ACO: anticoagulantes orales; AGP: antiagregantes plaquetarios; FA: fibrilación auricular; ECE: enfermedad coronaria estable; ICP: intervención coronaria percutánea; SCA: síndrome coronario agudo; Terapia triple: ACO+ácido acetilsalicílico+clopidogrel; Terapia dual: ACO+ ácido acetil salicílico o clopidogrel. (\*) ACO+1AGP (preferiblemente clopidogrel) en pacientes muy seleccionados (*stent* en tronco coronario izquierdo, descendente anterior o bifurcación proximal)

**Bibliografía**

- Lip GY et al. Management of antithrombotic therapy in atrial fibrillation patients presenting with acute coronary syndrome and/or undergoing percutaneous coronary or valve interventions. Eur Heart J. 2014;35(45):3155-79.
- ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. 2014. Eur Heart J. 2014;35(37):2541-619.
- Camm AJ et al. Management of Atrial Fibrillation of ESC. Eur Heart J. 2010;31(19):2369-429.
- Jiménez Hernández MD et al. Ictus. PAI. 2015.

Los algoritmos se basan en las evidencias y recomendaciones de la bibliografía citada, adaptadas a las circunstancias de nuestro medio.