Publicado: Viernes, 27 Marzo 2020 00:00

Noticias de la semana 13 de 2020:

Revisión sobre medicamentos utilizados para tratar la infección por COVID-19

Se ha publicado un artículo sobre los tratamientos frente a la infección por COVID-19 que revisa el fundamento, la experiencia y los resultados disponibles con: remdesivir, cloroquina e hidroxicloroquina, lopinavir / ritonavir, nitazoxanida, tocilizumab y corticoesteroides. También considera otros tratamientos cuyos riesgos parecen superar a los beneficios como: ribavirina +/- interferón, oseltamivir y baloxavir; y, presenta un cuadro con otros medicamentos bajo investigación.

Tratamientos frente al COVID-19: tabla de evidencia

La *American Society of Health-System Pharmacists* ha publicado una tabla de evaluación de la evidencia de los tratamientos relacionados con el COVID-19. La tabla presenta los medicamentos, el grupo farmacológico, la experiencia clínica (con enlace virtual cuando está disponible) y una columna de comentarios en la que se evalúa el uso. La tabla es de fecha 24-03-2020, por lo que puede actualizarse.

SGLT2: monitorizar cuerpos cetónicos en sangre en hospitalizados con diabetes

El boletín británico *Drug Safety Update* recomienda que en los pacientes hospitalizados por una intervención quirúrgica o enfermedad grave a los que se interrumpe el tratamiento con un antidiabético ISGLT2 (flozinas), se deben monitorizar los cuerpos cetónicos preferentemente en sangre. El tratamiento se reiniciará una vez que los valores sean normales y se hayan estabilizado las condiciones del paciente.

Esta situación podría producirse en pacientes con diabetes ingresados por infección por COVID-19.

Phoca PDF