

Noticias de interés farmacoterapéutico.

TDAH en Adultos

New England Journal of Medicine ha publicado una revisión sobre el [Trastorno por déficit de atención e hiperactividad en adultos](#). Incluye información sobre el diagnóstico con la evaluación de los síntomas, su repercusión y las comorbilidades. El objetivo del tratamiento es el abordaje de los síntomas y las dificultades cognitivas, siendo los elementos centrales la psicoeducación y la medicación —ya sea psicoestimulante o no estimulante—, por lo general en combinación con intervenciones psicosociales.

Glaucoma

Se ha publicado en *Australian Prescriber* una revisión sobre el tratamiento de la [glaucoma en el adulto](#). Se ofrece información sobre las diferentes tipologías, factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento farmacológico y no farmacológico. El tratamiento farmacológico consiste principalmente en fármacos hipotensores oculares de uso tópico (análogos de prostaglandinas, betabloqueantes, agonistas alfa-2, inhibidores de la anhidrasa carbónica y agentes colinérgicos), mientras que los medicamentos sistémicos se reservan para situaciones específicas, como una elevación aguda o grave de la presión intraocular. Incluye una tabla con el resumen de las características y eficacia de cada uno de los tratamientos farmacológicos tópicos.

Uso concomitante de betabloqueantes e ISRS

La revista *Br J Clin Pharmacol* publica una [revisión sobre los eventos adversos asociados al uso concomitante de betabloqueantes e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina \(ISRS\)](#). El evento adverso descrito con más frecuencia fue la bradicardia asociado a las combinaciones de metoprolol con fluoxetina, paroxetina o sertralina, o bien de propranolol con fluoxetina. Además, se describen alteraciones de la presión arterial y síntomas de carácter neurocognitivo.