Publicado: Miércoles, 27 Marzo 2019 10:58

Noticias de la semana 13ª de 2019:

Gabapentina y pregabalina ¿a altas dosis?

El boletín canadiense *Therapeutics Iniatitive* ha elaborado un artículo sobre la justificación de uso de altas dosis de gabapentina y pregabalina que cuestiona exceder los 1.800 mg/día de gabapentina o 300 mg/día de pregabalina porque pueden aumentar los efectos adversos sin mejorar el alivio del dolor. Se concluye que se debería evaluar el beneficio frente al riesgo a las 1-2 semanas de tratamiento y revaluarlo con frecuencia para reducir las dosis o abordar la deprescripción.

Riesgo de diabetes asociado a estatinas

Un estudio observacional publicado en *Br J Clin Pharmacol* sobre el uso de estatinas con el riesgo de hiperglucemia y diabetes tipo 2, realizado sobre 9.535 pacientes entre 1997 y 2012 muestra mayor riesgo de hiperglucemia, resistencia a insulina y eventualmente diabetes tipo 2 en los tratados con estatinas, especialmente en pacientes con sobrepeso y los tratamientos prolongados.

Reacciones adversas cutáneas graves por medicamentos

El Boletín de Farmacovigilancia de Cataluña ha publicado una revisión sobre reacciones adversas cutáneas graves por fármacos que presenta los datos clínicos para su diagnóstico, así como los principales fármacos implicados.

Phoca PDF